



УДК 616-089; 617.5

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ГРЫЖ ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ В СОЧЕТАНИИ С ГАСТРОЭЗОФАГЕЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНЬЮ

Ташев И.А., Доскалиев Ж.А., Ельчибаев Б.М., Канаев Р.Ж., Ильясов Н.К., Нургалиев Е.Г., Оспанов М.Б.
АО «Национальный научный медицинский центр» Астана, Казахстан

Введение: Сочетание ГПОД и ГЭРБ среди других заболеваний пищеварительного тракта, занимает 2-3 место, уступая таким распространенным патологиям. Использование эндовидеохирургической техники для выполнения этих вмешательств, позволило снизить инвазивность и добиться лучших послеоперационных результатов.

Цель: На примере собственных наблюдений, установить эффективность эндовидеохирургических методик при коррекции ГПОД в сочетании ГЭРБ.

Материал и методы исследования: В основу работы положен опыт хирургического лечения 234 пациентов с ГПОД в сочетании с ГЭРБ. Из них женщин было 114, мужчин - 120. Возраст пациентов колебался от 21 до 72 лет. Распределение пациентов было по возрасту и полу, в зависимости от формы ГПОД, от вида выполненного вмешательства, а также по видам осложнения (ГЭРБ).

Результаты и их обсуждение: Исходы выполненных антирефлюксных операций оценивали по выраженности болей в области послеоперационных ран и за грудиной, наличии дисфагии, отрыжки, регургитации и изжоги. Основными жалобами всех оперированных был дискомфорт, вызванный, оставленный на одни сутки, назозофагогастральным зондом и умеренные боли в области послеоперационных ран. Хорошие непосредственные результаты были получены у 186 (79,4%) пациентов, удовлетворительные - у 48 (20,6%). Неудовлетворительных результатов не было. Отдаленные результаты, лапароскопической коррекции ГПОД в сочетании ГЭРБ, изучены у 97 (41,5%) пациентов через 3, 6 месяцев, 1 и 2 года после операции. При анализе полученных данных хорошие результаты были получены у - 68 (70,1%) пациентов, удовлетворительные - у 25 (25,8%), неудовлетворительные - у 4 (4,1%).

Выводы: Лапароскопическая фундопликация Nissen и Touret являются эффективными методами коррекции ГПОД в сочетании ГЭРБ. Лапароскопическая парциальная задняя фундопликация по Touret имеет лучшие отдаленные результаты, чем антирефлюксная операция Nissen: показана при осложненных формах ГПОД в сочетании ГЭРБ.

Ключевые слова: Лапароскопическая фундопликация, антирефлюксная операция, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы.